

Sortgrå Ryle *Calidris maritima*



En vinterfugletur langs den sydlige mole ved den gamle Knudshoved færgehavn er ensbetydende med at se, om den Sortgrå Ryle er på plads og i gang med fødesøgningen. Hver isfrie vinter opholder en lille gruppe af de små, livlige ryler sig i området. Ved at færdes roligt i området kan man let komme til at iagttage gruppen af Sortgrå Ryler, mens de søger føde i vandkanten mellem stenene. Fuglene er rimelig tillidsfulde og har en relativ kort flugtafstand set i forhold til mange andre vadefugle. Kommer man for tæt på eller bevæger sig for hurtigt, så letter flokken og flyver et andet sted hen på molen eller dens nærmeste omegn.

Sortgrå Ryle er den vadefugleart, som har de nordligste vinteropholdssteder, hvilket sandsynligvis bl.a. hænger sammen med artens fødevalg og fødesøgningshabitater. Vi ser derfor Sortgrå Ryle hele vinteren her i landet og altså også her på Fyn. Arten er trofast overfor det valgte vinterkvarter og vender tilbage år efter år.



Sortgrå Ryle er en vadefugl, som hører til familien Sneppefugle, Scolopacidae. Den yngler ikke i Danmark, men ses i vinterhalvåret enkeltvis eller i små grupper langs vore kyster, på moler og lignende. Sortgrå Ryle er en udmærket svømmer, og man kan undertiden se den svømme langs stenmoler, mens den søger efter føde på stenene under vandet



Føden består fortrinsvis af bløddyr som snegle og muslinger, men bl.a. også krabber, ledorme og plantemateriale kan indgå i kosten.

Hunnerne er en smule større og har lidt længere næb end hannerne, hvilket gør, at Sortgrå Ryle kan udnytte et bredere spektrum af fødedyr m.m. Ellers er kønnene ens af udseende.



Link til [de seneste 14 dages observationer af Sortgrå Ryle på Fyn](#) i Dofbasen. Normalt ankommer de første Sortgrå Ryler til Fyn i september måned, dog er der i Dofbasen for Fyn i de seneste 25 år registreret en enkelt Sortgrå Ryle sidst i august 2007. De sidste fugle forlader igen Fyn i løbet af maj måned.




Forekomst af Sortgrå Ryle på Fyn de seneste 5 år (2013 – 2018) registreret i Dofbasen. .

Yngleområdet strækker sig over det arktiske område fra Canada over Skandinavien og ind i Sibirien, samt mod syd ned i den skandinaviske fjeldmark. Der findes ikke ringmærkningsresultater til at kunne dokumentere, hvor de trækfugle, vi ser her på Fyn om vinteren, kommer fra. (J. Bønlykke m.fl., 2006: Dansk trækfugleatlas). Se dog yderligere om ringmærkning af Sortgrå Ryler under linkene 3 -5 nedenfor, hvori bl.a. nævnes enkelte genmeldinger fra Svalbard af ringmærkede ryler fra Fyn.

Link til lydoptagelser af [Sortgrå Ryle](#) på [xeno-canto.org](#). I vinterkvarteret hos os vil Sortgrå Ryle reagere på alarmkald fra eksempelvis Almindelig Ryle og Snespurv og omvendt (se link 6 nedenfor).





Du kan finde yderligere information om Sortgrå Ryle her:

- (1) Link til artikel på Dofbasen om [Sortgrå Ryle](#)
- (2) Link til artikel på Fugleognatur.dk om [Sortgrå Ryle](#)
- (3) Link til Pandion.dof.dk om ringmærkning mm af Sortgrå Ryle: [kort nyt 1](#)
- (4) Link til artikel på den gamle doffyn web af Lars Hansen om ringmærkning af [Sortgrå Ryle](#)
- (5) Link til artikel på Dof.dk om en enkelt Sortgrå Ryles [trækforhold](#)
- (6) Link til engelsk artikel om [Sortgrå Ryle](#) på Animal Diversity Web (ADW)
- (7) En hjemmeside helliget [Sortgrå Ryle](#)

Disse artikler er også anvendt som kilde til nogle af informationerne i denne artikel.

Februar 2018

Tekst og foto[©]: Steen Lauritsen

